

Hoja de instrucciones para el paciente

El paciente recibirá medicamentos intravenosos durante su procedimiento dental operatorio. Por tanto, es muy importante que siga las siguientes instrucciones. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar para obtener más instrucciones: 316-788-5939. Es esencial para la seguridad del paciente que se adhiera estrictamente a las siguientes políticas. De no hacerlo, se cancelará el procedimiento quirúrgico y se puede poner al paciente en peligro de sufrir una lesión pulmonar grave o la muerte.

- 1. No comer durante 8 horas antes de la hora de llegada:**
 - a. Ningún alimento sólido de ningún tipo, leche, queso, yogur, helado, jugo o caldo
 - b. Sin caramelos, chicles, mentas ni vitaminas
 - c. Ningún producto que contenga proteínas o productos lácteos, incluso si parecen claros
- 2. Se permiten líquidos claros hasta 3 horas antes de la hora de llegada. Los líquidos aprobados son:**
 - a. Agua, Sprite/7-up/Sierra Mist o Gatorade de cualquier color o sabor
 - b. Gelatina simple sin frutas agregadas, sin verduras y sin crema batida
 - c. Café negro-sin nata ni azúcar añadido
- 3. NO cepille los dientes del niño en la mañana de la cita, el niño pueda tragar agua o pasta de dientes y esto resultará en la cancelación.**
- 4. Si el paciente tiene un inhalador o nebulizador, traiga su medicamento el día del procedimiento.**
- 5. Vístase con ropa cómoda, preferiblemente una camisa de manga corta. La sedación ocasionalmente puede hacer que el paciente se relaje lo suficiente como para perder el control de la vejiga. Es posible que desee considerar un dependiente o una muda de ropa.**
- 6. Haga arreglos para el transporte desde el consultorio del dentista/cirujano hasta su casa después del procedimiento.**
- 7. Después de la cirugía, espere hasta el día siguiente antes de participar en cualquier actividad en la que una disminución en el estado de alerta, el juicio o el coordinador pueda causar un problema, incluida la conducción.**
- 8. Después de la cirugía, puede tomar analgésicos según las indicaciones del cirujano. Sin embargo, evite el alcohol después de la operación durante 24 horas.**
- 9. Organice la asistencia de un adulto durante al menos 12 horas después de la cirugía.**