

Servicios de Anestesia Especiales

Hoja de Instrucciones de Descarga

1. Dieta según la tolerancia. Restricciones o limitaciones específicas (si las hay) saldrán de su dentista o médico.
2. No opere maquinaria o vehículos motorizados hasta el día después del procedimiento.
3. No tome ninguna decisión legal hasta el día después de procedimiento.
4. Supervisión directa de un adulto se recomienda la noche del procedimiento. El paciente no se le permitirá participar en cualquier actividad en la que la falta de coordinación o el estado de alerta podría poner en peligro ellos (incluyendo escaleras). Puede reanudar sus actividades normales al día siguiente.
5. Si las náuseas o vómitos deben desarrollar, llame a su dentista para una receta. Restauración dental lleva a una alta incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios. Por esta razón, los medicamentos contra las náuseas se administran por vía intravenosa, en todos los casos como una medida preventiva.

Quando esto ocurre, suele ser autolimitante, es decir, el vómito puede ocurrir una o dos veces, y se desploma la náusea. **Vómitos sin comprobar en un niño puede ser un problema muy serio.** Si su hijo experimenta náusea postoperatoria y el vómito en el hogar, que dura **más de dos horas**, llame a su dentista, que le recetará un supositorio contra las náuseas.

6. Está bien tomar medicamentos para el dolor recetado por su dentista después del procedimiento.
7. En las primeras 24 horas, una fiebre de bajo grado menos de 100.5 grados F, es aceptable. Si la fiebre es superior a 100,5, por favor notifique inmediatamente a su dentista.
8. En caso de dolor, no se alivia con la administración regular de Tylenol o Motrin desarrollar, informe a su dentista lo que será la gestión de dolor por favor.
9. No beber sustancias que contienen alcohol por lo menos 24 horas después del procedimiento o mientras está tomando medicamentos para el dolor.
10. Consulte a nuestros documentos, página web o tarjetas si necesita ponerse en contacto con nuestra oficina con cualquier pregunta.
11. Si tiene alguna inquietud urgente o siente algo negativo ha desarrollado, por favor no dude en ponerse en contacto con la oficina de su médico de atención primaria, llevar al paciente a la atención urgente o vaya a la sala de emergencias más cercana.